

科目：健康教育

適用班級：801-808

□高中部

■國中部

學生班級：\_\_\_\_\_

學生姓名：\_\_\_\_\_

座號：\_\_\_\_\_

壹、是非題 請劃 A，請劃 B (每題 1 分，共 10 分)

- 性傳染病是只會透過性行為傳染的疾病，簡稱性病。
- 人類對於性病具有免疫力，所以不可能重複感染相同或同時感染兩種以上的性病。
- 非淋病性尿道炎與淋病的症狀完全相同。
- 先天性梅毒是一種小孩的遺傳性疾病。
- 尖形溼疣的傳染力極強，潛伏期長達半年，漸漸會長出顆粒物可能導致排尿困難。
- 個人衛生習慣不佳也可能因此感染性病。
- 性生活很單純，也會有感染 HPV 的可能。
- 愛滋孕婦生產時選擇剖腹產，能有效避免新生兒受到感染。
- 目前何大一所研發的「雞尾酒療法」可以有效控制愛滋病情，但無法痊癒。
- 100%的安全性行為指的是全程使用保險套。

## 貳、選擇題(每題 2.5 分，共 75 分)

- 性病較不可能感染身體哪些部位？(甲)頭髮 (乙)性器官 (丙)嘴巴 (丁)指甲  
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲丁。
- 下列哪一種疾病的病原體是細菌？(A)愛滋病 (B)淋病 (C)菜花 (D)生殖器疱疹。
- 下列敘述皆有關於性病，哪些是正確的說法？(甲)有機會交互感染其他性病 (乙)性伴侶一起就醫治療效果較佳 (丙)病原體僅能感染生殖器官 (丁)梅毒是目前感染率最高的性病  
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲丙。
- 男女生罹患淋病後的症狀比較，何者正確？(A)僅有男性會有排尿不舒服的症狀 (B)男性症狀比女性明顯 (C)僅有女性會有分泌物增加問題 (D)女性就醫率較高。
- 臺灣有百分之五十以上的淋病屬於「超級淋病」，下列何者是主因？  
(A)感染人數過多 (B)感染年齡層偏低 (C)性教育不普及 (D)濫用抗生素。
- 下列關於非淋菌性尿道炎的描述何者正確？  
(A)人類不具有免疫性 (B)症狀明顯，容易分辨 (C)新生兒會經由產道而感染腹膜炎 (D)症狀消除便可以自行停藥。
- 下列關於生殖器疱疹的敘述，何者正確？(A)由杜克萊氏嗜血桿菌引起 (B)傳染性不強但是復發率很高 (C)生殖器及尿道會有搔癢感及長出細小的水泡 (D)患者的傷處較多，所以感染上愛滋病的機會也較高。
- 如果在外生殖器官上發現不痛、不癢、不潰爛的肉色小顆粒物，則可能感染什麼疾病？  
(A)生殖器疱疹 (B)軟性下疳 (C)梅毒 (D)尖形溼疣。
- 下列傳染病與病原體的配對，何者正確？  
(A)淋病——金黃葡萄球菌 (B)非淋病性尿道炎——披衣菌 (C)菜花——HIV 病毒 (D)梅毒——人類乳突病毒。
- 梅毒是一種棘手的性病，如果感染了該如何治療？  
(A)第三期再看醫生即可 (B)接受抗生素治療 (C)採用民俗療法 (D)接受化療。
- 關於梅毒的症狀，下列敘述何者有誤？  
(A)初期會有會痛的小潰瘍 (B)小潰瘍一陣子後會消失 (C)中期可能出現紅疹 (D)嚴重時病原體會進入神經系統。
- 關於梅毒可能導致的後遺症，下列何者有誤？(A)精神錯亂 (B)心臟病 (C)外生殖器官出現疣狀物 (D)癱瘓。
- 下列何種性病的治療主要有雷射、冷凍、剪、刮及塗抹軟膏等方法？  
(A)淋病 (B)愛滋病 (C)尖形溼疣 (D)非淋菌性尿道炎。
- 下列關於尖形溼疣的敘述，何者有誤？(A)病原體為人類免疫缺乏病毒 (B)目前已有疫苗可供施打 (C)疫苗依照預防的 HPV 種類分為 2 價、4 價及 9 價 (D)每個人一生中有八成的機率會感染到 HPV。
- 請問「尖形溼疣」治癒的機會有多少？(A)完全沒有機會，因為目前沒有治療藥物 (B)很難根除，復發率高 (C)吃抗生素治療有機會治癒 (D)將患部電燒乾淨即可完全痊癒。

26. HIV 病毒的特性描述，下列何者正確？(A)攻擊人類免疫系統 (B)目前一旦感染後便能立刻精準篩檢 (C)與其他性病相比，HIV 病毒離開人體的存活率高 (D)病毒僅在性器官中存活。
27. 想要知道是否有罹患愛滋病，該怎麼做？(A)與他人進行不安全性行為，觀察此人是否有發病 (B)去捐血站捐血，可免費檢驗是否患病 (C)到匿名篩檢醫院進行檢查 (D)每個月進行一次性行為。
28. 關於「空窗期」的描述何者有誤？(A)此期間無法檢驗出得病 (B)愛滋病的空窗期約為 3 個月 (C)此時身體已經開始出現症狀 (D)此刻體內抗體濃度不高。
29. 愛滋病可由體液而感染，下列何者屬於體液？(甲)血液 (乙)精液 (丙)母乳 (丁)汗水 (A)甲乙丙丁 (B)甲乙 (C)甲乙丙 (D)乙丙丁。
30. 與愛滋感染者共同生活時，以下哪些行為不會感染愛滋病？(甲)游泳 (乙)擁抱 (丙)輕吻 (丁)撫摸 (戊)性行為 (己)一起吃飯 (庚)被蚊蟲叮咬 (A)甲乙丙丁戊己 (B)甲乙丙丁己庚 (C)甲乙丁戊己庚 (D)甲丙丁戊己庚。
31. 「目前性病的感染途徑只有經由性行為…現在我們可以從外貌去判斷一個人是否有感染性病。感染性病後一定要就醫治療才有痊癒或控制病情的機會…針對同一種性病，人類能終身免疫…」此段關於性病的敘述，共有幾個錯誤？(A)4 (B)3 (C)2 (D)1。
32. 關於下列感染性病的風險行為，何者相對較低？(A)吃避孕藥不戴保險套 (B)不吃避孕藥會戴保險套 (C)複雜性關係 (D)多重性伴侶。
33. 如果男生的生殖器官有不適症狀，可以去下列哪個科別看診？(A)泌尿科 (B)腸胃科 (C)精神科 (D)婦產科。
34. 人若是生病，就要看醫生治療，性病也是如此。下列關於性病的治療觀念，何者正確？(A)一定要治療，不可以輕忽 (B)一定要接受治療，因為延誤就醫死亡率高達 90% (C)能忍受發病症狀就不一定要治療 (D)不必治療，因為目前無藥可醫。
35. 女生過早發生性行為可能會產生生理危害，下列何者為非？(A)提高子宮頸癌機率 (B)感染性病 (C)未婚生子 (D)被同儕忌妒。
36. 如果女生的生殖器官有不適症狀，可以去下列哪個科別看診？(A)泌尿科 (B)腸胃科 (C)精神科 (D)婦產科。
37. 多數青少年認為只要兩情相悅即可發生性行為，顯示青少年對於下列何者議題仍需多加強？(A)性教育 (B)個人衛生 (C)心理健康 (D)傳染病。
38. 我們要對性有正確的觀念，才是負責與尊重的表現。下列關於性的態度，何者較不健康？(A)尊重自己與他人的身體自主權 (B)避免複雜性關係 (C)用情色的心態學習性病 (D)不從 A 片學習性教育。
39. 正確使用保險套非常重要，下列方式何者正確？(甲)同時帶兩個保險套 (乙)確認是否仍在保存期限內 (丙)使用前先用指甲刮表面確認正反面 (丁)用一次就要丟棄 (A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)乙丁。
40. 「全程使用保險套」，其含義為下列何者？(A)多次性行為皆使用同一個保險套 (B)射精前戴上保險套 (C)同時使用兩個以上的保險套 (D)從勃起到射精都要使用保險套。

參、配合題(每題 3 分，共 15 分) 可複選

(A)梅毒 (B)尖形溼疣 (C)非淋菌性尿道炎 (D)愛滋病 (E)生殖器疱疹；請以代號回答下列問題：

- 一、 哪些性病可能因為胎盤中的血液交換而傳染給胎兒？【 41 】。
- 二、 不安全的性接觸可能會被傳染哪些性病？【 42 】。
- 三、 刺青或穿耳洞器械消毒不確實又重複使用，可能會被傳染那些性病？【 43 】。
- 四、 哪些性病的病原體是細菌，可以使用抗生素治療？【 44 】。
- 五、 哪些性病可以施打疫苗預防感染？【 45 】。

答案卷：

109-1-3-8 建教

壹	1	×	2	×	3	×	4	×	5	○	6	○	7	○	8	○	9	○	10	×
貳	11	D	12	B	13	A	14	B	15	D	16	A	17	C	18	D	19	B	20	B
	21	A	22	C	23	C	24	A	25	B	26	A	27	C	28	C	29	C	30	B
	31	B	32	B	33	A	34	A	35	D	36	D	37	A	38	C	39	D	40	D
參	41	AD	42	全	43	AB D	44	AC	45	B										

